Orthèses de la main en traumatologie aide à la prescription

Pathologie	Photos orthèse	Libellé ordonnance	Options possibles à rajouter sur l'ordonnance	Consignes habituellement données par ORTHESIS, si pas d'indication de la part du médecin
Fracture de métacarpien et/ou de P1		Orthèse type intrinsèque + pour fracture M2, 3, 4 ou 5, et/ou *fracture P1*	Avec immobilisation du poignet Laisser IPP libre, avec/sans syndactylie	Toujours porter l'orthèse en fonction des recommandations de votre médecin. Généralement 4 à 6 semaines jours et nuits.
		Orthèse type thomine pour fracture M2,3,4 ou 5	Avec immobilisation du poignet Avec syndactylie Avec immobilisation de P1 *(si fracture P1)*	
		Orthèse type gantelet avec syndactylie pour fracture M2,3,4 ou 5	Avec immobilisation du poignet	
		Orthèse thermoformée de pouce, avec poignet, pour fracture de M1	Poignet libre IP immobilisé *(si fracture P1)*	

Orthèses de la main en traumatologie aide à la prescription

Pathologie	Photos orthèse	Libellé ordonnance	Options possibles à rajouter sur l'ordonnance	Consignes habituellement données par ORTHESIS, si pas d'indication de la part du médecin
Fracture P2		Orthèse thermoformée sur mesure pour fracture de P2 + Tensoplast 3cm	☐ IPD libre	Toujours porter l'orthèse en fonction des recommandations de votre médecin. Généralement 4 à 6 semaines jours et nuits.
Entorse IPP	Si atteinte de la plaque palmaire : 	Orthèse IPP stop pour entorse IPP et lésion de la plaque palmaire	Protocole de port si différent de celui d'ORTHESIS	- La nuit : immobilisation en extension - Le jour : flexion autorisée sauf dans les activités à risque (sport, …)
	Si pas d'atteinte de la plaque palmaire : 	Orthèse en tube pour entorse IPP, IPD libre		Port 24h/24, avec mobilisation active douce 3 à 4 fois par jour
Mallet finger		Orthèse sur mesure pour **Mallet finger**, à renouveler 4 fois + Tensoplast 3cm	☐ IPP stop limitant l'hyperextension de l'IPP	**<u>NE PAS RETIRER L'ORTHESE</u>**. Port strict jours et nuits pendant 8 semaines, à faire renouveler tous les 15j.
Fracture de la houppe		Orthèse thermoformée pour fracture de la houpe, à renouveler si besoin + tensoplast 3cm		Toujours porter l'attelle en fonction des recommandations de votre médecin. Généralement 4 à 6 semaines, jours et nuits.

1, Rue du Chapeau Rouge 69009 LYON ☎ : 04 72 53 70 80 Mail : secretariat@orthesis.fr
www.orthesis.fr